

Status indlæg fra Hede Danmark medio maj 2014!

Efter en længere periode med store mængder af nedbør, samt stigende temperature, er væksten i græsset kommet godt i gang. Til trods for de store mængder af regn, har vi ikke haft de store problemer med våde og smattede områder på banen. Der er ingen tvivl om at det store arbejde der bliver lagt i at vertidraine fairways, har gavnet.

Status på greens!

Greens er stadig noget ujævne i overfladen, men vi kan se at væksten er intensiveret og de huller og bare pletter der er, stille og roligt er ved at lukke sammen. Til trods for de forbedrede forhold i vækstlaget, er vi blevet ramt af lidt Fusarium på greens. Det ses som kobber røde pletter på størrelse med en gammeldags femkrone. Forekomsten skyldes der fugtige og våde forår. Sidst vi oplevede et angreb af denne type var i sensommeren/ efteråret 2012, det var også i forlængelse af en længere periode med regn. Angrebet vil forsage lidt forsinkelse i sammengroningen af greens, for at kompensere for ujævnhederne, vi vil øge intervallerne i topdressning af greens.

Vi kan dog konstatere, at greens generelt er markant længere fremme end sidste år ved samme tidspunkt. Det er meget positivt, og er uden tvivl et resultat af det store eftersåningsarbejde på greens, kombineret med det intensive luftningsprogram.

"Hvorfor bliver greens ikke klippet hverdag i denne periode"

Vi har i en længere periode her i foråret, ikke klippet greens dagligt. Årsagen her til er, at vi gerne vil give græsset de bedste muligheder for en god start på vækståret. Ved at sænke klippe intervallerne, sænker vi også stress niveauet på græs planten. Hver gang der klippes, skal græsset efterfølgende bruge energi fra dets depoter til at regenererer det sår som kniven på klipperen har fortaget. Jo lavere energi niveau planten besidder i sit depot, desto større mulighed er der for at græsset bliver stresset, og herved mere modtagelig for sygdomsangreb.

Klippehøjden er også højere end den vil være i højsæsonen. Det skyldes at vi gerne vil optimere fotosyntesen i planten. Jo større plantemasse desto større fotosyntese ("store solceller producere mere energi end små").

Stankelbenslarver på greens!

Vi har i år haft observeret en større forekomst af stankelbenslarver i greens. Larverne lever af græssets rødder og er derfor ikke velkommen her. De trives godt i humusrig jord med høj fugtighed. Selve larven udklækkes stil stankelben i August/ september. Vi har det sidste års tid forsøgt at bekæmpe dem med det biologiske middel Bactimos. Midlet bliver optaget i larvens mave og nedbryder dens tarm.

I har måske set døde larver ligge på greens, det har typisk været en til to dage efter en behandling. Forekomsten af krager og råger er en klar indikation på at der er larver i jorden. De hakker i greens, der hvor der er larver og spiser dem. Vi foretrækker dog stære da de ikke forsager nogen skade på greens.

Afslutningsvis ser vi frem til et godt samarbejde med alle spillere i klubben.

Med Venlig Hilsen
Hede Danmark